



HELLOWみどり



お子さんが風邪などの病気にかかり、保育園や幼稚園に通えない時に、お預かりする施設です

★ 新型コロナウイルス感染症が急拡大しています。ご利用希望の方は、
めざわこどもクリニックホームページ「病児保育室みどり」の受け入れ対応を参照してください。

先月の病児保育室利用者について(2022.3月)

利用者数	病名	認可等	ナーサリー等	その他	キャンセル
1	発熱 (PCR検査陰性)	1	0	0	1

5歳~11歳 新型コロナワクチン接種が始まりました!



さい さい こさま
5歳から11歳のお子様へ

2022年2月10日

新型コロナウイルス接種についてのお知らせ

新型コロナウイルスをなぜ受けるの?

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、怠るしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナウイルスを受けるときは、どんなことに注意すればいいの?

受ける前	37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。	
受ける時	ワクチンは肩の近くに注射します。 肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。	
受けた後	<ul style="list-style-type: none"> ◎ ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子を見ましょう。(30分様子を見る場合もあります) ◎ 当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2~3日で自然とよくなるのがわかっています。 ○ ねつ ○ 気持ちわるさ ○ だるさ ○ おなかをこわす ○ 頭のいたみ ○ さむけ 

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

● 受けたすぐ後

- 体のかゆさ
- せき



● 受けた日や4日くらいの間

- ねつ ○ 頭のいたみ ○ 胸のいたみ ○ 怠るしさ
- だるさ ○ さむけ ○ 胸がドキドキした感じ



このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。

守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。



オミクロン株の最新情報

オミクロン株の症状・重症化や感染力などは BA.1 BA.2とは コロナ変異ウイルス最新情報 |

感染 子どもと高齢者が増加

NHK参照

オミクロン株では、子どもと高齢者の感染が多くなっています。

10歳未満の新規感染者数は12/28まで353人→2/8まで76,856人 217倍


▼再感染のリスク

WHOは、オミクロン株ではワクチンや過去の感染によって免疫を持つ人でも再感染しやすくなる変異があるとしています。

オミクロン株の再感染のリスクは、デルタ株に比べて5.41倍

▼オミクロン株BA1とBA2

現在流行しているオミクロン株BA1から約1.5倍の感染力といわれ、症状はほぼ同等のオミクロン株BA2に、置き換わる可能性が高まっている。




ワクチン接種による入院を防ぐ効果

	入院を防ぐ効果
2回接種 (2~24週経過)	72%
2回接種 (25週以上経過)	52%
3回接種 (2週以上経過)	88%

最近の感染症

- ・新型コロナウイルス感染症: 流行中
(特に12歳未満)
- ・ウイルス性胃腸炎: 流行中
- ・その他、感染症以外
花粉症のお子さんが多くなっています



2022.04.01発行